



STATISTIQUES CANADIENNES SUR LE CANCER COLORECTAL - 2021

Le Réseau de ressources et d'action sur le cancer colorectal (CCRAN) a publié le résumé suivant basé sur les Statistiques canadiennes sur le cancer 2020 publiées par la Société canadienne du cancer, Statistique Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et les registres provinciaux/territoriaux du cancer. Nous avons présenté des informations pertinentes sur le cancer colorectal, mais si vous souhaitez consulter la publication concernant l'ensemble des statistiques, vous pouvez le faire à l'adresse suivante:

<https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/colorectal/statistics/?region=on>



STATISTIQUES SUR LE CANCER COLORECTAL



Les cancers du poumon et des bronches (poumon), du sein, colorectal et de la prostate représentent près de la moitié de tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués.

Le cancer du poumon est le cancer le plus souvent diagnostiqué au Canada, avec 29 600 cas prévus en 2021. Il est suivi par le cancer du sein (27 700), le cancer colorectal (24 800) et le cancer de la prostate (24 000).

Plus de la moitié (56 %) des cas de cancer colorectal devraient survenir chez des Canadiens qui ont atteint l'âge visé par les lignes directrices en matière de dépistage (50 à 74 ans). Environ 7 % des cas de cancer colorectal devraient être diagnostiqués chez des personnes de moins de 50 ans.

Chez les hommes et les femmes, le taux de cancer colorectal était le plus élevé à Terre-Neuve-et-Labrador, tandis que les taux de cancer du poumon étaient les plus élevés dans les autres provinces de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard).

Les taux d'incidence du cancer colorectal ont diminué entre 1984 et 1996 (-0,7% chez les hommes et -1,5% chez les femmes). Les taux d'incidence sont restés stables pour les hommes et les femmes de 1996 à 2000, puis ont diminué modérément de 2000 à 2011 (-0,5 % chez les hommes et les femmes). Depuis 2011, les taux d'incidence du cancer colorectal ont diminué plus fortement chez les hommes (-2,2 %) et les femmes (-1,9 %).

La récente baisse des taux de cancer colorectal est probablement due en partie à l'augmentation du dépistage de la maladie, qui permet d'identifier les polypes précancéreux pouvant être traités et de réduire l'incidence du cancer. Entre 2007 et 2016, le Yukon et chaque province canadienne (à l'exception du Québec) ont mis en place des programmes organisés de dépistage du cancer colorectal. La baisse des taux d'incidence du cancer colorectal peut être limitée aux adultes plus âgés, car les taux seraient en augmentation chez les adultes de moins de 50 ans au Canada et aux États-Unis

Chez les hommes, le cancer du poumon devrait être la cause la plus fréquente de décès par cancer, représentant 25 % de tous les décès par cancer, suivi du cancer colorectal (12 %) et du cancer de la prostate (10 %). Chez les femmes, le cancer du poumon devrait être la principale cause de décès par cancer, représentant 26 % de l'ensemble des décès par cancer, suivi du cancer du sein (13 %) et du cancer colorectal (11 %).

Dans toutes les tranches d'âge (50 à 69 ans, 70 à 84 ans et 85 ans et plus), les causes les plus fréquentes de décès par cancer sont le cancer du poumon, suivi du cancer colorectal.

C'est à Terre-Neuve-et-Labrador que les taux de mortalité par cancer colorectal sont les plus élevés, tant chez les hommes que chez les femmes. Terre-Neuve-et-Labrador présente également un taux d'incidence élevé du cancer colorectal.

Les taux de mortalité liés au cancer colorectal ont considérablement diminué, tant chez les hommes (-2,3 % par an entre 2004 et 2015) que chez les femmes (-1,7 % par an entre 1984 et 2015). Une partie de cette baisse peut être due à la diminution de l'incidence signalée au chapitre 1 du rapport. En outre, il est probable qu'une part importante de la baisse de la mortalité soit due à l'amélioration des traitements. Actuellement, environ 50 % des cancers colorectaux sont détectés à un stade tardif (stade III ou IV). Étant donné le

lien étroit entre le stade au moment du diagnostic et la survie pour le cancer colorectal, une participation accrue aux programmes de dépistage du cancer colorectal au Canada pourrait contribuer à réduire davantage le cancer colorectal

les taux de mortalité dans un avenir proche.

Si le taux de survie au cancer colorectal s'est amélioré, il n'est encore que de 65 % à cinq ans. Cela reflète probablement le fait que près de 50 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués au stade III ou IV. Cependant, des programmes de dépistage du cancer colorectal en population existent dans tout le pays. Avec une participation accrue à ces programmes, on s'attend à ce que davantage de cancers soient diagnostiqués à un stade précoce et que la survie au cancer colorectal augmente.

CANADA

On estime à 24 800 (environ 13 700 hommes et 11 100 femmes) le nombre de nouveaux cas de cancer colorectal à l'échelle nationale et à 9 600 (environ 5 300 hommes et 4 300 femmes) le nombre de Canadiens qui mourront de cette maladie.

2021 PROVINCIAL COLORECTAL CANCER STATS						
	Estimated New Cases			Estimated Deaths		
	Men	Women	Total	Men	Women	Total
British Columbia	1,800	1,550	3,350	720	590	1,310
Alberta	1,250	1,000	2,250	450	350	800
Saskatchewan	500	320	820	160	140	300
Manitoba	430	340	770	190	160	350
Ontario	4,800	4,100	8,900	1,800	1,500	3,300
Quebec	3,600	2,800	6,400	1,400	1,200	2,600
New Brunswick	340	260	600	140	110	250
Nova Scotia	470	340	810	210	170	390
Prince Edward Island	85	60	145	30	25	55
Newfoundland & Labrador	370	300	670	140	110	250
CANADA (approx.)	13,645	11,070	24,715	5,240	4,355	9,605

Source: Canadian Cancer Statistics 2021 – Canadian Cancer Society, Statistics Canada, Provincial/Territorial Cancer Registries, Public Health Agency of Canada